



FORMATION 2024

Reconnaître les oiseaux communs de Bretagne

Séance 4 : Les oiseaux d'eau et de mer

Sommaire



p3 / GENERALITES

p5 / LES PRINCIPALES FAMILLES

Les zones humides

en Bretagne

❖ Roselière

❖ Tourbière

❖ Marais salés


❖ Prairies ou pelouses humides


❖ Forêt humide



La Manche

en Bretagne





Les principales familles
d'oiseaux d'eau

Ordre : Ansériformes


Famille : Anatidae

19

Espèces communes en
Bretagne

CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes à 3 doigts palmés
- ❖ Bec plat et arrondi
- ❖ Cou plus ou moins long
- ❖ Bons nageurs




Famille : Anatidae

Sous famille : Tadorne de Belon



- ❖ Silhouette de gros canard de surface
- ❖ Dos plus long
- ❖ Dimorphisme sexuel
- ❖ Régime alimentaire : insectivore



Ordre : Ansériformes

Famille : Anatidae

Sous famille : Tadorne de Belon




Famille : Anatidae

7

Espèces communes en
Bretagne

Sous famille : Canards de Surface

- ❖ Milieux : eaux peu profondes
- ❖ Bec plat
- ❖ Dos plat
- ❖ Dimorphisme sexuel
- ❖ Régime alimentaire : varié




Miroir : de couleur différente chez chaque espèce


Famille : Anatidae



Sous famille : Canards de Surface



Canard colvert



Canard pilet



Canard siffleur



Canard souchet

Famille : Anatidae

Sous famille : Canards de Surface



Sarcelle d'hiver



Sarcelle d'été

Famille : Anatidae

Sous famille : Canards plongeurs




- ❖ Pattes insérées à l'arrière du corps
- ❖ Dos arrondi
- ❖ Dimorphisme sexuel
- ❖ Court sur l'eau lors de l'envol



Famille : Anatidae

Sous famille : Canards plongeurs

Fuligule milouin



Fuligule morillon



Macreuse noire




Famille : Anatidae



Sous famille : Oies

- ❖ Gros oiseaux
- ❖ Cou long et épais
- ❖ Pattes courtes et insérées plus en avant
- ❖ Volent en V ou en lignes obliques
- ❖ Régime alimentaire : Végétarien



Famille : Anatidae

Sous famille : Oies



Oie cendrée



Bernache cravant

Famille : Anatidae

Sous famille : Cygnes




- ❖ Cou plus long que le corps
- ❖ Volent en V ou en lignes, vol lourd, le cou tendu
- ❖ Plumage mâle et femelle identique, souvent de couleur blanche
- ❖ Régime alimentaire : Végétarien



Famille : Anatidae

Sous famille : Cygnes



Cygne tuberculé



Cygne chanteur (peu commun)

Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Sternidae
(Les Sternes)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes courtes à 3 doigts palmés
- ❖ Bec fin, long et pointu
- ❖ Queue fourchue
- ❖ Ailes longues et pointues
- ❖ Pêchent en vol (Piqués, plongeurs)
- ❖ Marchent peu



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Sternidae
(Les Sternes)

Sterne caugek



Sterne Pierregarin



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Laridae
(Mouettes et Goélands)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes insérées au milieu du corps (3 doigts palmés, pouce réduit)
- ❖ Bec comprimé latéralement
- ❖ Ailes longues et larges
- ❖ Plumage à dominance blanche
- ❖ Alimentation et technique de pêches variées



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Laridae
(Mouettes et Goélands)



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Laridae

(Mouettes et Goélands)



Goéland brun

Goéland argenté



Goéland marin



Goéland cendré

Famille : Anatidae

1

Espèce commune en
Bretagne


Sous famille : Harles

- ❖ Bec long et mince, légèrement crochu
- ❖ Zone blanche sur l'aile
- ❖ Huppe plus ou moins marquée
- ❖ Vol rapide, corps tendu à l'horizontal
- ❖ Régime alimentaire : Piscivore



Famille : Anatidae

Sous famille : Harles



Harle huppé (mâle)

Ordre : Podicipediformes

Famille : Podicipedidae
(les grèbes)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes insérées à l'arrière du corps (3 doigts aplatis)
- ❖ Bec pointu
- ❖ Cou long et mince
- ❖ Queue inexistante
- ❖ Ne marchent pas
- ❖ Bons plongeurs



Ordre : Podicipediformes

Famille : Podicipedidae (les grèbes)

Grèbe huppé (nuptial)



Grèbe jougris (nuptial)
(peu commun)



Grèbe esclavon (internuptial)



Grèbe à cou noir (nuptial)



Grèbe castagneux
(internuptial)



Ordre : Pélécianiformes

Famille : Phalacrocoracidae
(les Cormorans)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes insérées à l'arrière du corps
(4 doigts palmés, pouce opposable)
- ❖ Bec long et crochu
- ❖ Cou long
- ❖ Queue en losange



Ordre : Pélécianiformes

Famille : Phalacrocoracidae
(les Cormorans)



Grand cormoran



Cormoran huppé

Ordre : Gaviiformes

Famille :
Gaviidae
(Plongeurs)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Nagent bas sur l'eau
- ❖ Corps élancé
- ❖ Long cou trapu
- ❖ Pattes placées loin en arrière
- ❖ Plongent pour se nourrir (poissons)



Ordre : Gaviiformes

Famille :
Gaviidae
(Plongeurs)



Plongeon imbrin (nuptial)



Plongeon arctique (nuptial)



Plongeon catmarin
(nuptial)

Ordre : Charadriiformes

Famille :
Alcidae
(pingouins et guillemots)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Noir et blanc
- ❖ Pélagiques
- ❖ Corps allongé et étroit
- ❖ Ailes étroites et courtes, volent juste au dessus de l'eau
- ❖ Plongent d'un coup d'ailes et « volent » sous l'eau
- ❖ Se nourrissent de poissons et crustacés



Ordre : Gaviiformes

Famille :
Alcidae
(pingouins et guillemots)



Pingouin torda



Ordre : Gaviiformes

Famille :
Alcidae
(pingouins et guillemots)



Guillemot de Troïl

Ordre : Gaviiformes

Famille :
Alcidae
(pingouins et guillemots)



Macareux moine (localisé)

Ordre : Ciconiiformes

Famille : Ardeidae
(les Hérons)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes et doigts longs sans palmure (pouce opposable)
- ❖ Bec et cou longs
- ❖ Corps allongé et dressé
- ❖ Volent et dorment le cou replié
- ❖ Pêchent à vue



Ordre : Ciconiiformes

Famille : Ardeidae
(les Hérons)



Héron garde-bœuf
(peu commun)



Grande aigrette



Aigrette garzette



Héron cendré

Ordre : Ciconiiformes


Famille : Threskiornithidae
(les Spatules et Ibis)

1

Espèce commune en
Bretagne

CARACTÈRES COMMUNS


- ❖ Pattes semi palmées (pouce bien développé)
- ❖ Cou long
- ❖ Bec long et aplati
- ❖ Corps massif
- ❖ Vol le cou allongé
- ❖ Pêchent au toucher du bec



Ordre : Ciconiiformes

Famille : Threskiornithidae
(les Spatules et Ibis)

Spatule blanche



Ibis falcinelle (peu commune)



Ordre : Gruiformes

Famille : Rallidae
(les Râles)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes à doigts longs non palmés
- ❖ Bec droit de taille variable
- ❖ Ailes larges et rondes



Ordre : Gruiformes

Famille : Rallidae
(les Râles)



Râle d'eau



Gallinule poule d'eau



Foulque macroule

Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Haematopodidae
(L'huîtrier pie)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes longues à 3 doigts
- ❖ Bec long, droit et robuste
- ❖ Plumage noir et blanc



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Haematopodidae
(L'huîtrier pie)



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Recurvirostridae
(Echasses et Avocettes)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes longues
- ❖ Bec fin et recourbé
- ❖ Plumage noir et blanc




Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Recurvirostridae
(Echasses et Avocettes)

Echasse blanche



Avocette élégante
(peu commune)

Ordre : Charadriiformes


Super Famille : Limicoles

Famille :
Charadriidae
(Pluviers et Gravelots)



CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes longues ou moyennes
- ❖ Bec court
- ❖ Plumage à couleurs contrastés
- ❖ Chassent à vue



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Charadriidae
(Pluviers et Gravelots)



Gravelot à collier interrompu



Grand gravelot



Petit gravelot

Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles


Famille :
Charadriidae
(Pluviers et Gravelots)



Pluvier argenté



Pluvier doré



Vanneau huppé


Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

CARACTÈRES COMMUNS

- ❖ Pattes longues ou moyennes (3 doigts développés)
- ❖ Bec long et fin
- ❖ Chassent au toucher du bec
- ❖ Couleur des pattes et du bec toujours importante
- ❖ Détails de plumages souvent important



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

BÉCASSEAUX (Bec 1 à 2 fois la tête)

Bécasseau variable

Bécasseau Sanderling

Bécasseau maubèche



Peuvent être observés : Bécasseau minute, de Temminck, cocorli, violet, rousset, tacheté,

...

Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

CHEVALIERS (Bec 1 à 2 fois la tête)

3 « grands » Chevaliers : gambette, arlequin, aboyeur,

3 « petits » Chevalier guignette, culblanc, sylvain

+ le Combattant varié



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

BARGES (Bec 3 fois la tête)

Barge rousse
Barge à queue noire



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

COURLIS (Bec 3 fois la tête)

Courlis cendré
Courlis corlieu



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

CRITERES A OBSERVER :

Bec rouge et noir



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

Sourcil



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

Pattes rouge-orangé



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

Pattes jaune-verdâtre



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

Pattes noires



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

Plumage



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

Plumage



Ordre : Charadriiformes

Super Famille : Limicoles

Famille :
Scolopacidae

Plumage





Observatoire Régional de l'Avifaune
| Bretagne



19 rue de Gouesnou

BP 62132

29221 Brest cédex 2



02 98 49 07 18



contact@bretagnevivante.org



www.bretagne-vivante.org

